

K-théorie équivariante des variétés de drapeaux et des variétés de Bott-Samelson.

Matthieu WILLEMS

Résumé

Le but de ce texte est de donner explicitement les valeurs des restrictions aux points fixes d'une base $\hat{\psi}_w$ (resp. $\hat{\mu}_\epsilon$) de la K -théorie équivariante des variétés de drapeaux (resp. des variétés de Bott-Samelson). On donne tout d'abord une démonstration combinatoire de la formule des ψ_w (théorème 1). Grâce à la formule de localisation, on calcule ensuite une base μ_ϵ de la K -théorie équivariante des variétés de Bott-Samelson (théorème 3) ce qui nous donne une démonstration plus géométrique du théorème 1. Cette étude nous permet également de calculer la matrice de changement de bases entre $\hat{\psi}_w$ et $*[\mathcal{O}_{\overline{X}_w}]$.

Abstract

The aim of this text is to give an explicit formula for the restriction to the fixed points of a basis $\hat{\psi}_w$ (resp. $\hat{\mu}_\epsilon$) of the equivariant K -theory of the flag varieties (resp. of the Bott-Samelson varieties). First of all, we give a combinatorial proof of the formula for the ψ_w (theorem 1). Then, we calculate a basis μ_ϵ of the equivariant K -theory of the Bott-Samelson varieties using the localization formula (theorem 3). Then we give a more geometric proof of the theorem 1 using the theorem 3. In the finite case, we describe how the basis $*[\mathcal{O}_{\overline{X}_w}]$ transforms with respect to the basis $\hat{\psi}_w$.

Après avoir rédigé cette note, j'ai eu connaissance de résultats de William Graham qui prouve la formule du théorème 1 de deux manières différentes dans le preprint [10]. Une de ses deux démonstrations utilise des idées similaires à celles développées dans les sections 3 et 4. Ces idées sont utilisées par Sarah Billey dans [3] dans le cas de la cohomologie équivariante. Pour le type A , les algèbres de Hecke sont également utilisées dans les articles [13] et [7] dans le cadre de la K -théorie équivariante. Dans [10], William Graham donne des formules explicites pour la restriction aux points fixes des classes $[\mathcal{O}_{\overline{X}_w}]$.

1 Préliminaires et notations

Les définitions et les résultats qui suivent sur les algèbres de Kac-Moody sont exposés dans [8]. Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq r}$ une matrice de Cartan généralisée (c'est-à-dire telle que $a_{ii} = 2$, $-a_{ij} \in \mathbb{N}$ si $i \neq j$, et $a_{ij} = 0$ si et seulement si $a_{ji} = 0$). On choisit un triplet $(\mathfrak{h}, \pi, \pi^\vee)$ (unique à isomorphisme près), où $\mathfrak{h}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension $(2r - \text{rg}(A))$, $\pi = \{\alpha_i\}_{1 \leq i \leq r} \subset \mathfrak{h}^*$, et

$\pi^\vee = \{h_i\}_{1 \leq i \leq r} \subset \mathfrak{h}$ sont des ensembles d'éléments linéairement indépendants vérifiant $\alpha_j(h_i) = a_{ij}$. L'algèbre de Kac-Moody $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}(A)$ est l'algèbre de Lie sur $\mathbb{C}$ engendrée par $\mathfrak{h}$ et par les symboles e_i et f_i ($1 \leq i \leq r$) soumis aux relations $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}] = 0$, $[h, e_i] = \alpha_i(h)e_i$, $[h, f_i] = -\alpha_i(h)f_i$ pour tout $h \in \mathfrak{h}$ et tout $1 \leq i \leq r$, $[e_i, f_j] = \delta_{ij}h_j$ pour tout $1 \leq i, j \leq r$, et :

$$(\text{ad} e_i)^{1-a_{ij}}(e_j) = 0 = (\text{ad} f_i)^{1-a_{ij}}(f_j) \quad \forall \quad 1 \leq i \neq j \leq r.$$

L'algèbre $\mathfrak{h}$ s'injecte canoniquement dans $\mathfrak{g}$. On l'appelle la sous-algèbre de Cartan de $\mathfrak{g}$. On a la décomposition suivante :

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \sum_{\alpha \in \Delta_+} (\mathfrak{g}_\alpha \oplus \mathfrak{g}_{-\alpha}),$$

où pour $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, $\mathfrak{g}_\lambda = \{x \in \mathfrak{g} \text{ tels que } [h, x] = \lambda(h)x, \forall h \in \mathfrak{h}\}$, et où on définit Δ_+ par $\Delta_+ = \{\alpha \in \sum_{i=1}^r \mathbb{N}\alpha_i \text{ tels que } \alpha \neq 0 \text{ et } \mathfrak{g}_\alpha \neq 0\}$. On pose $\Delta = \Delta_+ \cup \Delta_-$ où $\Delta_- = -\Delta_+$. On appelle Δ_+ (respectivement Δ_-) l'ensemble des racines positives (respectivement négatives). Les racines $\{\alpha_i\}_{1 \leq i \leq r}$ sont appelées les racines simples. On définit une sous-algèbre de Borel $\mathfrak{b}$ de $\mathfrak{g}$ par $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \sum_{\alpha \in \Delta_+} \mathfrak{g}_\alpha$.

Au couple $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$, on associe le groupe de Weyl $W \subset \text{Aut}(\mathfrak{h}^*)$, engendré par les réflexions simples $\{r_i\}_{1 \leq i \leq r}$, où $r_i(\lambda) = \lambda - \lambda(h_i)\alpha_i$ pour tout $\lambda \in \mathfrak{h}^*$. Le groupe W étant un groupe de Coxeter, on a une notion d'ordre de Bruhat qu'on notera $u \leq v$ et une notion de longueur qu'on notera $l(w)$. On notera 1 l'élément neutre de W et dans le cas fini (i.e W fini $\Leftrightarrow A$ définie positive $\Leftrightarrow \mathfrak{g}$ de dimension finie), on note w_0 le plus grand élément de W . Le groupe de Weyl préserve Δ . On pose $R = W\pi$ et $R^+ = R \cap \Delta_+$. Pour $\beta = w\alpha_i \in R^+$, on pose $r_\beta = wr_iw^{-1} \in W$ (qui est indépendant du choix du couple (w, α_i) vérifiant $\beta = w\alpha_i$). Pour un élément w de W , on définit l'ensemble $\Delta(w)$ des inversions de w par $\Delta(w) = \Delta_+ \cap w^{-1}\Delta_-$.

On fixe un réseau $\mathfrak{h}_\mathbb{Z} \subset \mathfrak{h}$ tel que :

- (i) $\mathfrak{h}_\mathbb{Z} \otimes_\mathbb{Z} \mathbb{C} = \mathfrak{h}$,
- (ii) $h_i \in \mathfrak{h}_\mathbb{Z}$ pour tout $1 \leq i \leq r$,
- (iii) $\mathfrak{h}_\mathbb{Z} / \sum_{i=1}^r \mathbb{Z}h_i$ est sans torsion,
- (iv) $\alpha_i \in \mathfrak{h}_\mathbb{Z}^* = \text{Hom}(\mathfrak{h}_\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$ ($\subset \mathfrak{h}^*$) pour tout $1 \leq i \leq r$.

On choisit des poids fondamentaux $\rho_i \in \mathfrak{h}_\mathbb{Z}^*$ ($1 \leq i \leq r$) qui vérifient $\rho_i(h_j) = \delta_{ij}$, pour tout $1 \leq i, j \leq r$. On pose $\rho = \sum_{i=1}^r \rho_i$.

On note $G = G(A)$ le groupe de Kac-Moody associé à $\mathfrak{g}$ par Kac et Peterson dans [9]. Dans le cas fini, G est un groupe de Lie semi-simple complexe connexe et simplement connexe. On note $H \subset B \subset G$ les sous-groupes de G associés respectivement à $\mathfrak{h}$ et $\mathfrak{b}$. Soit K la forme unitaire standard de G et $T = K \cap H$ le tore maximal de K associé à $\mathfrak{h}$. On pose $X = G/B = K/T$. On fait agir T sur X par multiplication à gauche.

Soit $X[T]$ le groupe des caractères de T , on pose $R[T] = \mathbb{Z}[X[T]]$ et on note $Q[T]$ le corps des fractions de $R[T]$. Pour un poids entier λ , on note $e^\lambda \in X[T]$ le caractère correspondant.

On note $F(W, R[T])$ (respectivement $F(W, Q[T])$) l'algèbre des fonctions sur W à valeurs dans $R[T]$ (respectivement $Q[T]$) munie de l'addition et de la multiplication point par point. Pour tout $1 \leq i \leq r$, on définit un opérateur de Demazure D_i sur $F(W, Q[T])$ par :

$$(D_i f)(v) = \frac{f(v) - f(vr_i)e^{-v\alpha_i}}{1 - e^{-v\alpha_i}}.$$

Les opérateurs de Demazure vérifiant les relations de tresses de W , on peut définir un opérateur D_w pour tout $w \in W$. On note Ψ la sous-algèbre de $F(W, R[T])$ définie par :

$$\Psi = \{f \in F(W, R[T]), \text{ telles que } \forall w \in W, D_w f \in F(W, R[T])\}.$$

2 K -théorie équivariante des variétés de drapeaux

On définit la K -théorie T -équivariante de $X = G/B$ comme le groupe construit à partir du semi-groupe des classes d'isomorphisme de fibrés complexes T -équivariants au dessus de X . On munit ce groupe d'une structure d'anneau définie à l'aide du produit tensoriel. De plus comme la K -théorie T -équivariante du point s'identifie à $R[T]$, on obtient une structure de $R[T]$ -algèbre qu'on notera $K_T(X)$. L'ensemble X^T des points fixes de X sous l'action de T s'identifie à W . L'injection de X^T dans X définit une application $i_T^* : K_T(X) \rightarrow K_T(X^T)$. De plus, l'ensemble des points fixes étant discret, on peut identifier $K_T(X^T)$ avec $F(W, R[T])$ et on a ainsi une application $i_T^* : K_T(X) \rightarrow F(W, R[T])$. On notera $*$ l'involution de $K_T(X)$ définie par la dualité des fibrés et on notera de la même façon l'involution de $R[T]$ définie sur les caractères par $*(e^\lambda) = e^{-\lambda}$, ce qui induit une involution de $F(W, R[T])$. Pour tout élément $\tau \in K_T(X)$, $*i_T^*(\tau) = i_T^*(\tau)$. Le résultat suivant est prouvé dans [11] :

Proposition 1 *L'application i_T^* est injective et l'image de $K_T(X)$ par cette application est égale à Ψ . De plus, $\Psi = \prod_{w \in W} R[T]\psi^w$, où les fonctions ψ^w sont caractérisées par les propriétés suivantes :*

- (i) $\psi^w(v) = 0$ sauf si $w \leq v$,
- (ii) $\psi^w(w) = \prod_{\beta \in \Delta(w^{-1})} (1 - e^\beta)$,
- (iii) $\begin{cases} D_i \psi^w = \psi^w + \psi^{wr_i} & \text{si } wr_i < w, \\ D_i \psi^w = 0 & \text{si } wr_i > w, \end{cases}$
- (iv) $\forall v \in W, \psi^1(v) = e^{\rho - v\rho}$.

On pose $\hat{\psi}^w = (i_T^*)^{-1}(\psi^w)$.

Remarque 1 *Un élément $f = (a_w)_{w \in W}$ de $\prod_{w \in W} R[T]\psi^w$ est bien une fonction de W à valeurs dans $R[T]$. En effet soit $v \in W$, d'après la propriété (i), $\sum_{w \in W} a_w \psi^w(v)$ est une somme finie où les termes éventuellement non nuls correspondent aux éléments u de W qui vérifient $u \leq v$.*

Dans [11], B. Kostant et S. Kumar composent i_T^* avec $\phi : F(W, Q[T]) \rightarrow F(W, Q[T])$ définie par $\phi(f)(w) = f(w^{-1})$ pour tout élément f de $F(W, Q[T])$

et tout $w \in W$. Ils trouvent alors la sous algèbre Ψ' (notée Ψ dans [11]) de $F(W, R[T])$:

$$\Psi' = \{f \in F(W, R[T]), \text{ telles que } \forall w \in W, D'_w f \in F(W, R[T])\},$$

où les opérateurs D'_w sont définis à partir des opérateurs D'_i donnés par :

$$(D'_i f)(v) = \frac{f(v) - f(r_i v) e^{-v^{-1} \alpha_i}}{1 - e^{-v^{-1} \alpha_i}}.$$

Ils considèrent la base ψ'_w (notée ψ^w dans [11]) de Ψ' reliée à la base ψ^w de la proposition 1 par la relation $\psi'_w = \phi(\psi^{w^{-1}})$. Pour tout couple $(w, v) \in W^2$, $\psi'_w(v) = \psi^{w^{-1}}(v^{-1})$.

On définit le monoïde $\underline{W}$ comme le monoïde engendré par les éléments $\{\underline{r}_i\}_{1 \leq i \leq r}$ soumis aux relations $\underline{r}_i^2 = \underline{r}_i$ et aux mêmes relations de tresses que les éléments r_i de W . D'après l'étude générale des algèbres de Hecke, l'ensemble $\underline{W}$ s'identifie à l'ensemble W . Pour un élément w de W , on notera $\underline{w}$ l'élément correspondant dans $\underline{W}$ et pour $\underline{v} \in \underline{W}$, on notera v l'élément associé dans W . Dans $\underline{W}$, on a les relations suivantes :

$$\begin{cases} \underline{w} \underline{r}_i = \underline{w r_i} & \text{si } w r_i > w, \\ \underline{w} \underline{r}_i = \underline{w} & \text{si } w r_i < w. \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \underline{r}_i \underline{w} = \underline{r_i w} & \text{si } r_i w > w, \\ \underline{r}_i \underline{w} = \underline{w} & \text{si } r_i w < w. \end{cases} \quad (2)$$

Soit $v \in W$ et soit $v = r_{i_1} \cdots r_{i_l}$ une décomposition réduite de v . Pour $1 \leq j \leq l$, on définit un élément $\beta_j \in \mathfrak{h}^*$ par $\beta_j = r_{i_1} \cdots r_{i_{j-1}} \alpha_{i_j}$.

Théorème 1 *Si $w \in W$ est tel que $w \leq v$, on a la formule suivante :*

$$\psi^w(v) = e^{\rho - v\rho} \sum_{l(w) \leq m \leq l(v)} \sum (e^{-\beta_{j_1}} - 1) \cdots (e^{-\beta_{j_m}} - 1),$$

où la deuxième somme porte sur l'ensemble des entiers $1 \leq j_1 < \cdots < j_m \leq l$ tels que $\underline{r_{i_{j_1}}} \cdots \underline{r_{i_{j_m}}} = \underline{w}$.

Donnons quelques exemples de calculs pour expliciter cette formule.

Tout d'abord pour tout $v \in W$, on retrouve bien $\psi^1(v) = e^{\rho - v\rho}$, puisque la seule façon de trouver 1 en dessous de v est de prendre la suite vide.

Plaçons nous dans le cas où $G = SL_4(\mathbb{C})$. Calculons $\psi^w(v)$ avec $w = r_3 r_2$ et $v = r_2 r_3 r_2 r_1 r_2$. Il y a 3 façons de "trouver $\underline{w}$ en dessous de v " : $\underline{w} = \underline{r_{i_2}} \underline{r_{i_3}}$, $\underline{w} = \underline{r_{i_2}} \underline{r_{i_5}}$, $\underline{w} = \underline{r_{i_2}} \underline{r_{i_3}} \underline{r_{i_5}}$, et on trouve donc :

$$\begin{aligned} \psi^w(v) &= e^{\alpha_2 + (\alpha_2 + \alpha_3) + \alpha_3 + (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + (\alpha_1 + \alpha_2)} [(e^{-(\alpha_2 + \alpha_3)} - 1)(e^{-\alpha_3} - 1) \\ &+ (e^{-(\alpha_2 + \alpha_3)} - 1)(e^{-(\alpha_1 + \alpha_2)} - 1) + (e^{-(\alpha_2 + \alpha_3)} - 1)(e^{-\alpha_3} - 1)(e^{-(\alpha_1 + \alpha_2)} - 1)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= e^{2\alpha_1+4\alpha_2+3\alpha_3} [1 + e^{-(\alpha_1+2\alpha_2+2\alpha_3)} - e^{-(\alpha_2+\alpha_3)} - e^{-(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)}] \\
&= e^{2\alpha_1+4\alpha_2+3\alpha_3} + e^{\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3} - e^{2\alpha_1+3\alpha_2+2\alpha_3} - e^{\alpha_1+3\alpha_2+2\alpha_3}.
\end{aligned}$$

Nous allons maintenant montrer que l'expression du théorème 1 est indépendante de la décomposition réduite de v choisie puis que les éléments de $F(W, R[T])$ ainsi définis vérifient les propriétés de la proposition 1.

3 Indépendance par rapport au choix d'une décomposition réduite de v

Soit A un anneau commutatif. On définit l'algèbre $\mathcal{H}$ comme la A -algèbre de Hecke engendrée par $\{u_i\}_{1 \leq i \leq r}$ soumis aux relations de tresses définissant W et aux relations $u_i^2 = u_i$. Soit $w \in W$, on peut définir $u_w \in \mathcal{H}$ par $u_w = u_{i_1} \cdots u_{i_l}$ où $w = r_{i_1} \cdots r_{i_l}$ est une décomposition réduite quelconque de w . Les éléments $\{u_w\}_{w \in W}$ forment une base du A -module $\mathcal{H}$.

Soit $r_{i_1}, \dots, r_{i_k}$ une suite de réflexions simples et soit $\underline{w} = \underline{r}_{i_1} \cdots \underline{r}_{i_k} \in \underline{W}$. D'après les relations vérifiées par les u_i , $u_{i_1} \cdots u_{i_k} = u_w$.

Pour tout $1 \leq i \leq r$, on définit la fonction

$$h_i : \begin{array}{l} A \rightarrow \mathcal{H} \\ x \mapsto 1 + (x - 1)u_i. \end{array}$$

On vérifie que ces fonctions h_i satisfont les relations suivantes (énoncées sous une forme différente dans [6]) :

Proposition 2 *Soient $1 \leq i, j \leq r$ des entiers distincts, deux éléments quelconques x et y de A vérifient les équations suivantes :*

$$\left\{ \begin{array}{ll} h_i(x)h_j(y) = h_j(y)h_i(x) & \text{si } (r_i r_j)^2 = 1, \\ h_i(x)h_j(xy)h_i(y) = h_j(y)h_i(xy)h_j(x) & \text{si } (r_i r_j)^3 = 1, \\ h_i(x)h_j(xy)h_i(xy^2)h_j(y) = h_j(y)h_i(xy^2)h_j(xy)h_i(x) & \text{si } (r_i r_j)^4 = 1, \\ h_i(x)h_j(x^3y)h_i(x^2y)h_j(x^3y^2)h_i(xy)h_j(y) & \\ = h_j(y)h_i(xy)h_j(x^3y^2)h_i(x^2y)h_j(x^3y)h_i(x) & \text{si } (r_i r_j)^6 = 1. \end{array} \right.$$

Dans la suite, on prendra pour A l'anneau $R[T]$. Soit $w \in W$ et $w = r_{i_1} \cdots r_{i_l}$ une décomposition réduite de w . On définit un élément de $\mathcal{H}$ par :

$$\mathcal{R}_{i_1, \dots, i_l} = \prod_{j=1}^l h_{i_j}(e^{-\beta_{i_j}}).$$

A l'aide de la proposition 2, une démonstration analogue à celle donnée par S. Billey dans [3] dans le cas de l'algèbre nil-Coxeter nous donne le résultat suivant :

Théorème 2 Soit $w \in W$. L'élément $\mathcal{R}_{i_1, \dots, i_l}$ de $\mathcal{H}$ est indépendant du choix d'une décomposition réduite $w = r_{i_1} \cdots r_{i_l}$ de w . Il ne dépend que de w et on le notera donc $\mathcal{R}_w$.

Donnons une idée de la démonstration. D'après la définition de $\mathcal{R}_{i_1, \dots, i_l}$ et d'après la connexité du graphe des décompositions réduites de w , on peut se contenter de regarder ce qui se passe pour un élément w correspondant à une relation de tresses. Prenons par exemple $w = r_i r_j r_i = r_j r_i r_j$. Alors $\mathcal{R}_{i,j,i} = h_i(e^{-\alpha_i})h_j(e^{-\alpha_i-\alpha_j})h_i(e^{-\alpha_j})$ et $\mathcal{R}_{j,i,j} = h_j(e^{-\alpha_j})h_i(e^{-\alpha_i-\alpha_j})h_j(e^{-\alpha_i})$, et en utilisant la deuxième relation de la proposition 2, on obtient le résultat. Les autres cas se traitent de la même manière.

Le terme $\sum_{l(w) \leq m \leq l(v)} \sum (e^{-\beta_{j_1}} - 1) \cdots (e^{-\beta_{j_m}} - 1)$ du théorème 1 est le coefficient de R_v sur u_w dans la base $\{u_w\}_{w \in W}$ de $\mathcal{H}$ et est donc bien indépendant de la décomposition réduite de v choisie.

4 Démonstration du théorème

Notons $\tilde{\psi}^w$ l'élément de $F(W, R[T])$ défini par la formule du théorème 1 (on pose $\tilde{\psi}^w(v) = 0$ si v n'est pas plus grand que w). Pour démontrer ce théorème, il suffit de montrer que les fonctions $(\tilde{\psi}^w)_{w \in W}$ vérifient les quatre propriétés de la proposition 1. Les propriétés (i) et (iv) sont immédiates.

Pour démontrer la propriété (ii), rappelons tout d'abord les deux lemmes suivants (voir [4]) :

Lemme 1 Soit $v \in W$ et $v = s_{i_1} \cdots s_{i_k}$ une décomposition réduite de v , alors $\Delta(v^{-1}) = \{\beta_j, 1 \leq j \leq k\}$.

Lemme 2 Soit $v \in W$ et $v = s_{i_1} \cdots s_{i_k}$ une décomposition réduite de v , alors

$$\rho - v\rho = \sum_{j=1}^k \beta_j.$$

On a donc :

$$e^{\rho - v\rho} = \prod_{j=1}^l e^{\beta_j}. \quad (3)$$

De cette formule, on déduit pour tout $w \in W$:

$$\tilde{\psi}^w(w) = \prod_{\beta \in \Delta(w^{-1})} e^{\beta} \prod_{\beta \in \Delta(w^{-1})} (e^{-\beta} - 1) = \prod_{\beta \in \Delta(w^{-1})} (1 - e^{\beta}) = \psi^w(w),$$

ce qui nous donne la propriété (ii).

Montrons maintenant que les $(\tilde{\psi}^w)_{w \in W}$ vérifient la propriété (iii) de la proposition 1.

Soit $w \in W$ et r_i une réflexion simple. Supposons tout d'abord $wr_i > w$. Il faut alors montrer que pour tout $v \in W$, on a :

$$\tilde{\psi}^w(v) = \tilde{\psi}^w(vr_i)e^{-v\alpha_i}.$$

On peut supposer $vr_i > v$. Si v n'est pas plus grand que w , vr_i non plus car w n'a pas de décomposition qui commence par r_i car $wr_i > w$. On suppose donc $w \leq v < vr_i$. Comme w n'a aucune décomposition qui finit par r_i , la somme est la même à gauche et à droite de l'égalité. Il suffit donc de vérifier $e^{\rho-v\rho} = e^{\rho-vr_i\rho}e^{-v\alpha_i}$, ce qui est une conséquence immédiate de la formule 3.

Supposons maintenant $wr_i < w$. Il faut montrer que pour tout $v \in W$, on a :

$$\frac{\tilde{\psi}^w(v) - \tilde{\psi}^w(vr_i)e^{-v\alpha_i}}{1 - e^{-v\alpha_i}} = \tilde{\psi}^w(v) + \tilde{\psi}^{wr_i}(v). \quad (4)$$

Supposons tout d'abord $vr_i > v$. On se place dans le cas où $w \leq vr_i$ (sinon le résultat est trivial). On choisit une décomposition réduite $v = r_{i_1} \cdots r_{i_l}$ de v . On prend pour vr_i la décomposition $vr_i = r_{i_1} \cdots r_{i_l} r_i$. On trouve alors (en utilisant la formule 3) :

$$\tilde{\psi}^w(vr_i)e^{-v\alpha_i} = \tilde{\psi}^w(v) + (e^{-v\alpha_i} - 1)(\tilde{\psi}^w(v) + \tilde{\psi}^{wr_i}(v)),$$

le premier terme venant des sous décompositions de v "égales" à w , le deuxième des mêmes sous décompositions de v auxquelles on rajoute r_i à la fin et qui redonnent donc w (car $wr_i < w$), et le troisième des sous décompositions de v "égales" à wr_i . On trouve alors bien la formule 4.

Supposons maintenant $vr_i < v$. On peut appliquer ce qui précède à $v' = vr_i$ car $v'r_i > v'$ et on trouve :

$$\frac{\tilde{\psi}^w(vr_i) - \tilde{\psi}^w(v)e^{v\alpha_i}}{1 - e^{v\alpha_i}} = \tilde{\psi}^w(vr_i) + \tilde{\psi}^{r_i w}(vr_i).$$

De plus, on peut appliquer le cas $wr_i > w$ à $w' = wr_i$ et on obtient : $\tilde{\psi}^{wr_i}(vr_i) = e^{v\alpha_i} \tilde{\psi}^{wr_i}(v)$. En substituant ainsi $\tilde{\psi}^{wr_i}(vr_i)$ dans l'expression précédente, on obtient la formule 4.

5 K -théorie équivariante des variétés de Bott-Samelson

Dans toute la suite, on se place dans le cas fini ; G est donc un groupe de Lie semi-simple complexe simplement connexe d'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$, K est une forme réelle compacte de G , H est un sous-groupe de Cartan de G et $T = K \cap H$ est un tore maximal de K . On note e l'élément neutre de K . Soit N un entier strictement positif. Considérons une suite de N racines simples $\mu_1, \dots, \mu_N$ non nécessairement distinctes. Pour $1 \leq i \leq N$, on note G_i le sous-groupe fermé

connexe de G d'algèbre de Lie $\mathfrak{g}_{\mu_i} \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{g}_{-\mu_i}$ et on pose $K_i = G_i \cap K$. On définit :

$$\Gamma(\mu_1, \dots, \mu_N) = K_1 \times_T K_2 \times_T \dots \times_T K_N / T,$$

comme l'espace des orbites de $K_1 \times K_2 \times \dots \times K_N$ sous l'action à droite de T^N définie par :

$$(k_1, k_2, \dots, k_N)(t_1, t_2, \dots, t_N) = (k_1 t_1, t_1^{-1} k_2 t_2, \dots, t_{N-1}^{-1} k_N t_N), \quad t_i \in T, \quad k_i \in K_i.$$

On notera $[k_1, k_2, \dots, k_N]$ la classe de $(k_1, k_2, \dots, k_N)$ dans $\Gamma(\mu_1, \dots, \mu_N)$. On notera k_{μ_i} un représentant quelconque de la réflexion r_{μ_i} de $N_{K_i}(T)/T$. Dans la suite, on notera $\Gamma(\mu_1, \dots, \mu_N)$ par Γ . On munit Γ de sa structure complexe canonique définie dans [5].

On définit une action à gauche de T sur Γ par :

$$t[k_1, \dots, k_N] = [tk_1, \dots, k_N], \quad t \in T, \quad k_i \in K_i.$$

On pose $\mathcal{E} = \{0, 1\}^N$. Pour $\epsilon \in \mathcal{E}$, on note $Y_\epsilon \subset \Gamma$ l'ensemble des classes $[k_1, k_2, \dots, k_N]$ qui vérifient pour tout entier i compris entre 1 et N :

$$\begin{cases} k_i \in T & \text{si } \epsilon_i = 0, \\ k_i \notin T & \text{si } \epsilon_i = 1. \end{cases}$$

On vérifie immédiatement que cette définition est bien compatible avec l'action de T^N . On munit $\mathcal{E}$ d'une structure de groupe en identifiant $\{0, 1\}$ avec $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Pour $\epsilon \in \mathcal{E}$, on note $\pi_+(\epsilon)$ l'ensemble des entiers i tels que $\epsilon_i = 1$ et $\pi_-(\epsilon)$ l'ensemble des entiers i tels que $\epsilon_i = 0$. On pose $l(\epsilon) = \text{card}(\pi_+(\epsilon))$. On note $(i) \in \mathcal{E}$ l'élément de $\mathcal{E}$ défini par $(i)_j = \delta_{i,j}$. Pour $\epsilon \in \mathcal{E}$, on pose $v_i(\epsilon) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq i, \\ k \in \pi_+(\epsilon)}} r_{\mu_k}$, ($v_i(\epsilon) = 1$, si $\{1 \leq k \leq i, k \in \pi_+(\epsilon)\} = \emptyset$), $v(\epsilon) = v_{l(\epsilon)}(\epsilon)$

et $\alpha_i(\epsilon) = v_i(\epsilon)\mu_i$. On définit de même $\underline{v}(\epsilon) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq N, \\ k \in \pi_+(\epsilon)}} \underline{r_{\mu_k}} \in \underline{W}$. On définit

un ordre sur $\mathcal{E}$ par :

$$\epsilon \leq \epsilon' \iff \pi_+(\epsilon) \subset \pi_+(\epsilon').$$

On démontre alors facilement la proposition suivante :

Proposition 3 (i) Pour tout ϵ de $\mathcal{E}$, Y_ϵ est un espace affine de dimension réelle $2l(\epsilon)$.

(ii) Pour tout $\epsilon \in \mathcal{E}$, $\overline{Y_\epsilon} = \coprod_{\epsilon' \leq \epsilon} Y_{\epsilon'}$

(iii) $\Gamma = \coprod_{\epsilon \in \mathcal{E}} Y_\epsilon$

(iv) Pour tout $\epsilon \in \mathcal{E}$, Y_ϵ est stable par l'action de T .

De plus, nous allons avoir besoin du lemme suivant :

Lemme 3 (i) L'ensemble Γ^T des points fixes de Γ sous l'action de T est constitué des 2^N points :

$$[k_1, k_2, \dots, k_N], \text{ où } k_i \in \{e, k_{\mu_i}\}.$$

On identifiera donc Γ^T avec $\mathcal{E}$ en identifiant e avec 0 et k_{μ_i} avec 1.

(ii) Soit $(\epsilon, \epsilon') \in \mathcal{E}^2$, alors :

$$\epsilon \in \overline{Y_{\epsilon'}} \iff \epsilon \leq \epsilon',$$

et dans ce cas pour tout élément $h \in \mathfrak{h}$, on a :

$$\det(1 - e^h | T_{\epsilon'}^\epsilon) = \prod_{i \in \pi_+(\epsilon')} (1 - e^{\alpha_i(\epsilon)(h)}),$$

où $T_{\epsilon'}^\epsilon$ désigne l'espace tangent à $\overline{Y_{\epsilon'}}$ en ϵ .

Comme la variété Γ est lisse, $K_T(\Gamma)$ s'identifie à $K_0(H, \Gamma)$ (respectivement $K^0(H, \Gamma)$) le groupe construit à partir du semi-groupe des classes d'isomorphisme de faisceaux H -équivariants cohérents (respectivement H -équivariants localement libres) sur Γ . Dans la suite, on identifiera ces trois groupes. Soit $\epsilon \in \mathcal{E}$ et soit $\mathcal{F}$ un faisceau H -équivariant localement libre sur Γ , on définit son caractère $\chi(\overline{Y_\epsilon}, \mathcal{F}) \in X[T]$ sur $\overline{Y_\epsilon}$ par :

$$\forall t \in T, \chi(\overline{Y_\epsilon}, \mathcal{F})(t) = \sum_k (-1)^k \text{Tr}(t; H^k(\overline{Y_\epsilon}, \mathcal{F}_{/\overline{Y_\epsilon}})).$$

La décomposition $\Gamma = \coprod_{\epsilon \in \mathcal{E}} Y_\epsilon$ munit Γ d'une structure de CW -complexe T -équivariant où toutes les cellules sont lisses et de dimension paire; de plus l'ensemble des points fixes de l'action de T sur Γ est discret. Grace à cette structure, on a la proposition suivante :

Proposition 4 (i) La K -théorie T -équivariante de Γ^T s'identifie à l'algèbre des fonctions sur $\mathcal{E}$ à valeurs dans $R[T]$, qu'on notera $F(\mathcal{E}; R[T])$.

(ii) La restriction aux points fixes $i_T^* : K_T(\Gamma) \rightarrow F(\mathcal{E}; R[T])$ est injective.

(iii) La K -théorie T -équivariante de Γ est un $R[T]$ -module libre qui admet comme base la famille $\{\hat{\mu}_\epsilon\}_{\epsilon \in \mathcal{E}}$ caractérisée par :

$$\chi(\overline{Y_{\epsilon'}}, \hat{\mu}_\epsilon) = \delta_{\epsilon', \epsilon}.$$

Définition 1 Pour $\epsilon \in \mathcal{E}$, on définit $\mu_\epsilon \in F(\mathcal{E}; R[T])$ par :

$$\begin{cases} \mu_\epsilon(\epsilon') = \prod_{i \in \pi_+(\epsilon')} e^{\alpha_i(\epsilon')} \prod_{i \in \pi_+(\epsilon)} (e^{-\alpha_i(\epsilon')} - 1) & \text{si } \epsilon \leq \epsilon', \\ \mu_\epsilon(\epsilon') = 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On a alors le théorème suivant :

Théorème 3 Pour tout $\epsilon \in \mathcal{E}$, on a :

$$i_T^*(\hat{\mu}_\epsilon) = \mu_\epsilon.$$

DÉMONSTRATION :

En utilisant la formule de localisation d'Atiyah-Bott (voir [2]) et le lemme 3, on obtient pour tout $\hat{\mu} \in K_T(\Gamma)$ et tout $\epsilon \in \mathcal{E}$:

$$\chi(\overline{Y_\epsilon}, \hat{\mu}) = \sum_{\epsilon' \leq \epsilon} \frac{i_T^*(\hat{\mu})(\epsilon')}{\prod_{i \in \pi_+(\epsilon)} (1 - e^{\alpha_i(\epsilon')})}. \quad (5)$$

Soit $\epsilon_0 \in \mathcal{E}$, et soit $\mu'_{\epsilon_0} = i_T^*(\hat{\mu}_{\epsilon_0})$. Montrons par récurrence sur la longueur de ϵ que pour tout $\epsilon \in \mathcal{E}$, $\mu'_{\epsilon_0}(\epsilon) = \mu_{\epsilon_0}(\epsilon)$. Grace à la formule 5 et à la caractérisation de $\hat{\mu}_{\epsilon_0}$, on démontre facilement par récurrence sur $l(\epsilon)$ que si ϵ n'est pas plus grand que ϵ_0 , on a bien $\mu'_{\epsilon_0}(\epsilon) = 0$. On peut donc se limiter au cas où $\epsilon_0 \leq \epsilon$. Si $\epsilon = \epsilon_0$, la formule 5 et le fait que $\chi(\overline{Y_{\epsilon_0}}, \hat{\mu}_{\epsilon_0}) = 1$ nous donne bien $\mu'_{\epsilon_0}(\epsilon_0) = \mu_{\epsilon_0}(\epsilon_0)$. Soit $\epsilon > \epsilon_0$. On suppose le résultat vérifié pour tout ϵ' de longueur strictement plus petite que ϵ , on applique la formule 5 et le fait que $\chi(\overline{Y_\epsilon}, \hat{\mu}_{\epsilon_0}) = 0$ pour obtenir :

$$\sum_{\epsilon_0 \leq \epsilon' < \epsilon} \frac{\prod_{i \in \pi_+(\epsilon')} e^{\alpha_i(\epsilon')} \prod_{i \in \pi_+(\epsilon_0)} (e^{-\alpha_i(\epsilon')} - 1)}{\prod_{i \in \pi_+(\epsilon)} (1 - e^{\alpha_i(\epsilon')})} + \frac{\mu'_{\epsilon_0}(\epsilon)}{\prod_{i \in \pi_+(\epsilon)} (1 - e^{\alpha_i(\epsilon)})} = 0,$$

d'où :

$$\frac{\mu'_{\epsilon_0}(\epsilon)}{\prod_{i \in \pi_+(\epsilon)} (1 - e^{\alpha_i(\epsilon)})} = - \sum_{\epsilon_0 \leq \epsilon' < \epsilon} \frac{\prod_{i \in \pi_+(\epsilon') \setminus \pi_+(\epsilon_0)} e^{\alpha_i(\epsilon')}}{\prod_{i \in \pi_+(\epsilon) \setminus \pi_+(\epsilon_0)} (1 - e^{\alpha_i(\epsilon')})}.$$

Si on pose $\tilde{\epsilon} = \epsilon - (j)$, où j est le plus grand élément de $\pi_+(\epsilon) \setminus \pi_+(\epsilon_0)$, on a alors :

$$\frac{\mu'_{\epsilon_0}(\epsilon)}{\prod_{i \in \pi_+(\epsilon)} (1 - e^{\alpha_i(\epsilon)})} = \frac{\prod_{i \in \pi_+(\epsilon) \setminus \pi_+(\epsilon_0)} e^{\alpha_i(\epsilon)}}{\prod_{i \in \pi_+(\epsilon) \setminus \pi_+(\epsilon_0)} (1 - e^{\alpha_i(\epsilon)})} - \sum_{\substack{\epsilon_0 \leq \epsilon' < \epsilon \\ \epsilon' \neq \tilde{\epsilon}}} \frac{\prod_{i \in \pi_+(\epsilon') \setminus \pi_+(\epsilon_0)} e^{\alpha_i(\epsilon')}}{\prod_{i \in \pi_+(\epsilon) \setminus \pi_+(\epsilon_0)} (1 - e^{\alpha_i(\epsilon')})}.$$

En effet, comme j est le plus grand élément de $\pi_+(\epsilon) \setminus \pi_+(\epsilon_0)$, pour tout $i \in \pi_+(\epsilon) \setminus \pi_+(\epsilon_0)$, $\alpha_i(\epsilon) = \alpha_i(\tilde{\epsilon})$ si $i \neq j$ et $\alpha_j(\epsilon) = -\alpha_j(\tilde{\epsilon})$. On utilise alors la relation $\frac{e^{-x}}{1-e^{-x}} = -\frac{e^x}{1-e^x}$. Cette même relation montre, en distinguant les termes qui ont un 1 en j ème position et ceux qui ont un 0 en j ème position, que la deuxième somme est nulle et on obtient alors bien :

$$\mu'_{\epsilon_0}(\epsilon) = \prod_{i \in \pi_+(\epsilon)} e^{\alpha_i(\epsilon)} \prod_{i \in \pi_+(\epsilon_0)} (e^{-\alpha_i(\epsilon)} - 1) = \mu_{\epsilon_0}(\epsilon).$$

6 Une autre démonstration du théorème 1 dans le cas fini

Si on note S l'algèbre symétrique de $\mathfrak{h}^*$, un résultat analogue à la proposition 1 prouvé par A. Arabia dans [1] montre que la cohomologie équivariante de X s'identifie à une sous-algèbre Λ de $F(W, S)$, l'algèbre des fonctions de W à valeurs dans S munie de l'addition et de la multiplication point par point. Cette algèbre Λ est un S -module libre qui admet une base ξ^w indexée par W . Ces fonctions vérifient $\xi^w(v) = 0$ si v n'est pas plus grand que w et la formule suivante :

Théorème 4 *Soit $w \leq v$ et soit $v = r_{i_1} \cdots r_{i_l}$ une décomposition réduite de v . Si $l(w) = k$, alors :*

$$\xi^w(v) = \sum_{i_{j_1} < \cdots < i_{j_k}} \beta_{j_1} \cdots \beta_{j_k},$$

où la somme porte sur l'ensemble des indices $1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq l$ tels que $r_{i_{j_1}} \cdots r_{i_{j_k}} = w$.

Ce théorème est démontré de manière purement combinatoire par S. Billey dans [3]. Dans la note [14], on a retrouvé ce résultat en utilisant les variétés de Bott-Samelson. Le but de la suite est d'expliquer plus géométriquement le théorème 1 à l'aide de ces variétés dans le cas fini.

Soit $w_0 = r_{\mu_1} \cdots r_{\mu_N}$ une décomposition réduite du plus grand élément w_0 de W . On pose $\Gamma = \Gamma(\mu_1, \dots, \mu_N)$ et on définit une application T -équivariante g de Γ dans X par multiplication (i.e. $g([k_1, \dots, k_N]) = k_1 * \cdots * k_N \cdot [T]$).

La différence fondamentale avec ce qui se passe en cohomologie est due au fait que en cohomologie les opérateurs de Demazure A_i vérifient $A_i^2 = 0$ alors qu'en K -théorie, les opérateurs D_i vérifient $D_i^2 = D_i$. Une généralisation immédiate de la proposition 3.36 de [11], où le résultat n'est énoncé que pour des décompositions réduites, nous donne :

$$\forall \tau \in K_T(X), \quad \chi(\overline{Y}_\epsilon, g^*(\tau)) = *(D_{\underline{v}(\epsilon)} i_T^*(\tau))(1),$$

où pour $\underline{v} \in \underline{W}$, on a posé $D_{\underline{v}} = D_v$. Or d'après les propriétés (i), (ii) et (iii) de la proposition 1 :

$$\forall (v, w) \in W^2, (D_v(\psi^w))(1) = \delta_{v, w}.$$

On déduit des deux formules précédentes que pour tout $\epsilon \in \mathcal{E}$ et tout élément $w \in W$, on a

$$\chi(\overline{Y}_\epsilon, g^*(\hat{\psi}^w)) = \delta_{\underline{v}(\epsilon), \underline{w}}. \quad (6)$$

D'après la caractérisation de la base $\{\hat{\mu}_\epsilon\}_{\epsilon \in \mathcal{E}}$, on a donc :

$$\forall w \in W, g^*(\hat{\psi}^w) = \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}, \underline{v}(\epsilon) = \underline{w}} * \hat{\mu}_\epsilon.$$

Soit $(w, v) \in W^2$. Si on choisit un élément $\epsilon' \in \mathcal{E}$ tel que $g(\epsilon') = v$ et tel que $l(\epsilon') = l(v)$ (ce qui correspond au choix d'une décomposition réduite de v), la formule précédente nous montre que

$$\psi^w(v) = (i_T^*(\hat{\psi}^w))(v) = \sum_{\epsilon \in \mathcal{E}, \underline{v}(\epsilon) = \underline{w}} * \mu_\epsilon(\epsilon'),$$

ce qui nous redonne bien le théorème 1 à l'aide du théorème 3. On remarque que l'indépendance par rapport au choix d'une décomposition réduite de v est ici une conséquence immédiate du fait que pour tout fibré T -équivariant τ sur X , la représentation de T dans $g^*(\tau)_x$ est la même en tout point x de Γ qui vérifie $g(x) = v$. Cette vision géométrique montre également que la formule du théorème 1 reste valable si on prend une décomposition non réduite de v (ce qu'on peut aussi voir de manière combinatoire).

7 Une autre base de $K_T(X)$

Comme X est une variété lisse, tout comme dans le cas des variétés de Bott-Samelson, $K_T(X)$ s'identifie à $K_0(H, X)$ et à $K^0(H, X)$. On sait alors que la décomposition en cellules de Schubert $X = \coprod_{w \in W} X_w$ fournit une base $\{[\mathcal{O}]_{\overline{X}_w}\}_{w \in W}$ de $K_0(X, H)$. Les classes $[\mathcal{O}]_{\overline{X}_w}$ sont définies par le faisceau structural de $\overline{X}_w$ prolongé par 0 sur $X \setminus \overline{X}_w$. Pour $w \in W$, on pose $\hat{\sigma}^w = *[\mathcal{O}]_{\overline{X}_w} \in K_T(X)$, et $\sigma^w = i_T^*(\hat{\sigma}^w)$. Le résultat suivant est prouvé dans [11] :

Proposition 5 *Pour tout $w \in W$ et tout entier $1 \leq i \leq r$,*

$$D_i(\sigma^w) = \begin{cases} \sigma^w & \text{si } wr_i < w, \\ \sigma^{wr_i} & \text{si } wr_i > w. \end{cases}$$

On définit les éléments $a_w^v \in R[T]$ par $\sigma^w = \sum_{v \in W} a_w^v \psi^v$. On va donner une expression explicite de ces coefficients. Soit $w \in W$ et soit r_i une réflexion simple telle que $wr_i > w$. Si on applique l'opérateur D_i à la décomposition $\sigma^w = \sum_{v \in W} a_w^v \psi^v$, on obtient :

$$\sigma^{wr_i} = D_i(\sigma^w) = \sum_{v \in W} a_w^v D_i \psi^v.$$

En utilisant les relations vérifiées par les fonctions ψ^v , on trouve alors :

$$\sum_{v \in W} a_{wr_i}^v \psi^v = \sum_{v \in W, vr_i < v} a_w^v (\psi^v + \psi^{vr_i}) = \sum_{v \in W, vr_i < v} a_w^v \psi^v + \sum_{v \in W, vr_i > v} a_w^{vr_i} \psi^v.$$

On obtient donc la relation de récurrence suivante sur les coefficients a_w^v :

$$a_{wr_i}^v = \begin{cases} a_w^v & \text{si } vr_i < v, \\ a_w^{vr_i} & \text{si } vr_i > v. \end{cases}$$

De ces relations, on déduit en utilisant les relations 1 et 2 :

$$\forall (w, v) \in W^2, \quad a_w^v = a_1^v \frac{w^{-1}}{1}, \quad (7)$$

où pour $\underline{v} \in \underline{W}$, on a posé $a_1^{\underline{v}} = a_1^v$. Il suffit donc de trouver la décomposition de σ^1 . Pour cela, on aura besoin des valeurs de σ^1 :

$$\begin{cases} \sigma^1(1) = \prod_{\alpha \in \Delta_+} (1 - e^{-\alpha}), \\ \sigma^1(v) = 0 \quad \text{si } v \neq 1. \end{cases}$$

La valeur de $\sigma^1(1)$ est calculée à l'aide de la formule d'auto-intersection et les autres valeurs sont nulles par le théorème de localisation.

Comme on a $\hat{\sigma}^1 = \sum_{v \in W} a_1^v \hat{\psi}^v$, soit $v \in W$ et $\epsilon \in \mathcal{E}$ tel que $u(\epsilon) = v$, d'après la formule 6, le coefficient a_1^v est donné par :

$$a_1^v = * \chi(\overline{Y}_\epsilon, g^*(\hat{\sigma}^1)).$$

En utilisant la formule [2] et les valeurs de $*\sigma^1 = *i_T^* \hat{\sigma}^1$, on obtient alors :

$$a_1^v = \sum_{\epsilon' \leq \epsilon, u(\epsilon')=1} \frac{\prod_{\alpha \in \Delta_+} (1 - e^{-\alpha})}{\prod_{i \in \pi_+(\epsilon)} (1 - e^{-\alpha_i(\epsilon')})}.$$

On a donc la proposition suivante :

Proposition 6 *Soit $v \in W$ et soit $v = r_{i_1} \cdots r_{i_l}$ une décomposition réduite de v . Pour tout sous-ensemble I de $\{1, \dots, l\}$ et tout entier $1 \leq i \leq l$, on pose $\beta_i(I) = (\prod_{j \in I, j \leq i} r_{i_j}) \alpha_i$ ($\beta_i(I) = \alpha_i$ si $I \cap \{1, \dots, i\} = \emptyset$). Alors*

$$\sum_{k=0}^l \sum \frac{\prod_{\alpha \in \Delta_+} (1 - e^{-\alpha})}{\prod_{i=1}^l (1 - e^{-\beta_i(\{j_1, \dots, j_k\})})},$$

où la deuxième somme porte sur l'ensemble des indices $1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq l$ tels que $r_{i_{j_1}} \cdots r_{i_{j_k}} = 1$, est un élément de $R[T]$ qui ne dépend pas du choix d'une décomposition réduite de v . Si on note b^v cet élément, alors $a_1^v = b^v$.

Remarque 2 *La proposition précédente est encore valable si on prend une décomposition non réduite de v .*

Si on utilise la relation 7, et si pour $\underline{v} \in \underline{W}$, on pose $b^{\underline{v}} = b^v$, on obtient alors le théorème suivant

Théorème 5 *Soit $w \in W$, alors :*

$$*[\mathcal{O}_{X_w}] = \sum_{v \in W} b^{\underline{v}} \frac{w^{-1}}{1} \hat{\psi}^v.$$

Soit Q_W le $Q[T]$ -module libre qui admet pour base la famille $\{\delta_w\}_{w \in W}$ et qu'on munit d'une structure d'anneau définie par :

$$(q_1 \delta_{w_1}) \cdot (q_2 \delta_{w_2}) = q_1(w_1 q_2) \delta_{w_1 w_2}, \quad \forall (q_1, q_2) \in Q[T]^2, \text{ et } (w_1, w_2) \in W^2,$$

où l'action de W sur $Q[T]$ est déduite de celle de W sur T . Dans [11], B. Kostant et S. Kumar introduisent des éléments $\{y_i\}_{1 \leq i \leq r}$ de $Q[T]$ définis par :

$$y_i = \frac{1}{1 - e^{-\alpha_i}} (\delta_1 - e^{-\alpha_i} \delta_{r_i}).$$

Les y_i vérifiant les relations de tresses, on peut définir un élément $y_w \in Q_W$ pour tout $w \in W$. On définit alors des éléments $\{b_{v,w}\}_{(v,w) \in W^2}$ de $Q[T]$ par :

$$y_{v^{-1}} = \sum_{w \in W} b_{v,w} \delta_{w^{-1}}.$$

D'après l'expression combinatoire de $b_{v,w}$ donnée par le lemme 3.5 de [12], $b^v = b_{v^{-1},1} \prod_{\alpha \in \Delta_+} (1 - e^{-\alpha})$, et de plus dans [12], S. Kumar montre que quand $\overline{X}_v$ est lisse, $b_{v,1} = \prod_{\gamma \in S(v)} (1 - e^{-\gamma})^{-1}$, où pour $u \in W$, $S(u) = \{\alpha \in R^+, r_\alpha \leq u\}$. En particulier $b^{w_0} = 1$ et donc d'après le théorème 5 :

$$*[\mathcal{O}_{\overline{X}_{w_0}}] = \sum_{w \in W} \hat{\psi}_w.$$

Références

- [1] A. ARABIA – « Cohomologie T-équivariante de la variété de drapeaux d'un groupe de Kac-Moody », *Bulletin de la Société Mathématique de France* **117** (1989), p. 129–165.
- [2] M. ATIYAH et R. BOTT – « A Lefschetz fixed-point formula for elliptic complexes I », *Annals of Mathematics* **86** (1967), p. 347–407.
- [3] S. BILLEY – « Kostant polynomials and the cohomology of G/B », *Duke Mathematical Journal* **96** (1999), p. 205–224.
- [4] N. BOURBAKI – *Groupes et algèbres de Lie, chap. 4-6*, Hermann, Paris, 1968.
- [5] H. C. HANSEN – « On cycles in flag manifolds », *Mathematica Scandinavica* **33** (1973), p. 269–274.
- [6] S. FOMIN et A. N. KIRILLOV – « Universal exponential solution of the Yang-Baxter equation », *Letters in mathematical Physics* **37** (1996), p. 273–284.
- [7] S. FOMIN et A. N. KIRILLOV – « Yang-Baxter equation, symmetric functions and Grothendieck polynomials », *Math.hep-th/9306005* (1993).

- [8] V. G. KAC – *Infinite dimensional Lie algebras*, Cambridge University Press, 1985.
- [9] V. G. KAC et D. H. PETERSON – «Regular functions on certain infinite dimensional groups», *Arithmetic and Geometry-II*, Birkhäuser, 1983, p. 141–166.
- [10] W. GRAHAM – «Equivariant K-theory and Schubert varieties», *preprint*.
- [11] B. KOSTANT et S. KUMAR – «T-equivariant K-theory of generalized flag varieties», *Journal of Differential Geometry* **32** (1990), p. 549–603.
- [12] S. KUMAR – «The nil-Hecke ring and singularities of Schubert varieties», *Inventiones Mathematicae* **123** (1996), p. 471–506.
- [13] A. LASCoux, B. LECLERC et J.-Y. THIBON – «Flag varieties and the yang-Baxter equation», *Letters in mathematical Physics* **40** (1997), p. 75–90.
- [14] M. WILLEMS – «Cohomologie équivariante des variétés de Bott-Samelson», *Math.GR/0201050* (2002).

e-mail : willems@math.jussieu.fr